

5 สิ่งต้องเข้าใจ ก่อนใช้ชุดทดสอบแอนติเจน



1 เลือกซื้อชนิดชุดทดสอบแอนติเจนที่ถูกต้องตรงกับวิธีเก็บสิ่งส่งตรวจ
ถ้าตรวจเอง ต้องใช้แบบที่เก็บจากโพรงจมูกหรือน้ำลาย



2 ซื้อที่ร้านขายยาที่มีเภสัชกรแนะนำ

ชุดทดสอบเป็นเครื่องมือแพทย์ อนุญาตให้ขายที่ร้านขายยาที่มีเภสัชกรดูแลเท่านั้น เพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้อง



3 ทำความเข้าใจวิธีตรวจ อ่านเอกสารกำกับให้ถูกต้อง



4 เวลาตรวจมีข้อควรระวัง เช่น

- พื้นที่วางอุปกรณ์ต้องสะอาด หากมีการปนเปื้อนอาจส่งผลคลาดเคลื่อน
- การหย่อนจมูกควรหมุนวนให้สัมผัสผนังจมูกทั้ง 2 ข้าง หากเลือดออกใช้ไม่ได้
- อ่านผลตามระยะเวลาที่กำหนดในเอกสารกำกับ
- ตรวจเสร็จเก็บชุดทดสอบใส่ถุง ใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ หรือน้ำยักซักผ้าขาว



5 เข้าใจผลตรวจ และจะทำอะไรต่อไป



บนตลับชุดทดสอบแอนติเจนจะมีตัวอักษร C กับ T เมื่อครบเวลาขึ้นที่ตัว C เสมอ จึงดูที่ตัว T หากไม่มีแถบขึ้นแสดงว่าผลเป็นลบ มีแถบแสดงว่าผลเป็นบวก



● **หากผลเป็นลบ** แปลว่าไม่ติดเชื้อโควิด หรือติดเชื้อแต่ยังมีเชืื่อน้อย ต้องตรวจซ้ำอีก 3 - 5 วัน



● **หากผลเป็นบวก** รีบติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. หรือโทรสอบถาม 1330 หากต้องไปดูแลร่วมกับผู้ติดเชื้อโควิดรายอื่น อาจต้องทำการตรวจยืนยันด้วยวิธี rRT-PCR ก่อน




การอ่านและแปลผล ชุดทดสอบแอนติเจน



รูปแบบผล

การอ่านผล


การแปลผล



ปรากฏเฉพาะแถบควบคุม (C)

ผลลบ (Negative)


- ไม่พบการติดเชื้อโควิด ณ ช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่างตรวจ หรือมีการติดเชื้อในระดับต่ำ
- ตรวจซ้ำใน 3-5 วัน
- กรณีมีเหตุสงสัยอาจพิจารณาตรวจด้วยวิธี rRT-PCR



ปรากฏทั้งแถบควบคุม (C) และ แถบทดสอบ (T)
ไม่ว่าจะมีสีเข้มหรือสีจาง

ผลบวก (Positive)

- กำลังติดเชื้อโควิด และมีโอกาสแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น
- ติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านที่กำหนด หรือโทร 1330
- อาจต้องยืนยันด้วยการตรวจวิธี rRT-PCR บางกรณี



ไม่ปรากฏแถบควบคุม (C)
ไม่ว่าแถบทดสอบ (T) จะปรากฏหรือไม่ปรากฏก็ตาม

ผลใช้งานไม่ได้ (Invalid)

ไม่สามารถแปลผลได้ สาเหตุ


- ชุดตรวจเสื่อมสภาพ
- วิธีทำการทดสอบไม่ถูกต้อง
- ตัวอย่างตรวจมีสภาพไม่เหมาะสม






ผลตรวจออกแล้ว ต้องทำอะไรต่อ?

เมื่อผลตรวจออกแล้วต้องเข้าใจว่าเป็นอะไร
และต้องทำอะไรต่อไป



หากผลเป็นลบ -




แปลว่าอาจไม่ติดเชื้อโควิด
หรือติดเชื้อแล้วแต่ยังมีเชืื่อน้อย
จึงตรวจไม่เจอ (ผลบลวง)



ต้องตรวจซ้ำอีก 3 - 5 วัน



หากมีอาการ เช่น มีไข้ ไอ
เจ็บคอ ให้ตรวจได้เลย




หากผลเป็นบวก +



รีบติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน
เช่น คลินิกชุมชนอบอุ่น
หรือศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.
หรือโทรสอบถาม 1330



ต้องป้องกัน
การแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น



- การตรวจพบผลบวกแปลว่าติดเชื้อโควิด
- แต่มีจำนวนไม่มากที่เกิดผลบลวงแต่ไม่ติดเชื้อ
- กรณีที่พบผลบวก และต้องไปรับการดูแลร่วมกับผู้ติดเชื้อโควิดรายอื่น อาจต้องได้รับการตรวจยืนยันด้วยวิธี rRT-PCR